




אוקטב / אוקטאף / Octave

אבקה רטיבה, מכיל: Prochloraz Manganese 50%



קוטל פטריות להדברת מחוללי מחלות בצמחים

- 1 - לקבלת הדברה מיטבית של ריקבון חום ושל נמשון השקד מומלץ לרסס פעמיים: ריקבון חום - ריסוס ראשון בתחילת פריחה, ריסוס שני 10-12 ימים לאחר מכן. נמשון השקד - ריסוס ראשון בזמן הבלבוב, ריסוס שני 15-20 ימים לאחר מכן.
- 2 - גחלון- ריסוס ראשון החל ב-30% פריחה, ריסוסים נוספים מדי 7-10 ימים.
- 3 - יש ליישם אוקטב החל מתחילת הפריחה ועד לסיימה, מדי 14 יום. הפחתה בנגיעות תבטא בעונה העוקבת. יש להקפיד על סניטציה וסילוק תכרחות נגועות.
- 4 - יש ליישם טיפול מניעה החל מתחילת הפריחה או לכל המאוחר מהופעת נגיעות. יש לכלול במעקבת הטיפולים קוטלי פטריות בעלי מנגנון הפעולה שונה.
- 5 - לפני השתילה, טובלים את השתילים למשך 5-10 דקות בתרחיף בריכוז 0.2%. יש לערבב את התרחיף לפני כל טבילה.
- 6 - בהתאם לעוצמת הנגיעות.

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל מאוד לדגים ולבעלי חיים ימיים, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים
רעילות לדבורים:	אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	הכניסה לחלקה המטופלת מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים: אוקטב ניתן לשלב עם מרפאן בשקד. אין לשלב עם מרק קליפורני.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 83/ה"צ/836. מס' או"ם: 3077.

הוראות שימוש:



הגידול	המחלה	אופן היישום	המינון או הריכוז	נפח התרסיס	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
משמש, שזיף, שקד	ריקבון חום (מוניליה) ¹	ריסוס	0.06% (60 ג' ל-100 ליטר מים)	עד נגירה	50
שקד	נימשון השקד (פוליטיגימה) ¹	ריסוס	0.06%	עד נגירה	50
שקד	גחלון (אנתרקנוז) ²	ריסוס	אוקטב +0.06% מרפאן 0.25%	עד נגירה	50
מנגו	עיוות התכרחות ³ קימחון המנגו ⁴	ריסוס	0.1%	200-100 ל"ד	7
תות-שדה	גחלון (אנתרקנוז) ⁵	טבילה של השתילים	0.2%	-	-
ורד	דיפלודיית הענפים	ריסוס	0.2%	להרטבה מלאה	-
ציפורן	מגלת ורודה בגבעולים	ריסוס	0.2%	להרטבה מלאה	-
קוכיה	פיחת בגבעולים ובעלים	ריסוס	0.2%	להרטבה מלאה	-
מלפפון	מגלת המלפפון (פיזריום), גבעול זב (דידימלה)	הגמעה	0.1-0.2 ג' / צמח ⁶	50 סמ"ק לצמח	3