



מוסות צמיחה

התכשיר אלאר הינו מוסות צמיחה הפועל במערכת ההורמונלית בצמח. יעילות התכשיר מושפעת מגורמי סביבה שונים כגון: טמפרטורה, לחות, תאורה, דישון וזמינות מים. כמו-כן מותנית יעילותו של התכשיר במין הצמח, בזן, בקצב הצמיחה ובשלב הפתולוגי. לכן חלה חובה על המשתמש לערוך ניסוי מקדים בתנאי הגידול הייחודיים במשקו, כדי לקבוע את העיתוי והריכוז המדוייק בתחום הריכוזים המצוינים בטבלה.

**מיועד לשימוש בגידולים לא אכילים. אסור ליישום על גידולים המיועדים למאכל אדם או למאכלי בעלי חיים.**

רעילות לחי במים:	רעילות נמוכה ליצורים החיים במים
רעילות לדבורים:	רעילות נמוכה לדבורים
כניסה לשטח המטופל:	בחלוף 24 שעות מהריסוס
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

הגידול	מועד היישום	הריכוז (%)	נכח התרסיס ('ל/ד')	הערות
גידול בעציצים: חרצית	<b>ריסוס 1:</b> 10 ימים לאחר הקיטום, או כאשר הפריצות באורך 2.5-4 ס"מ. <b>ריסוס 2:</b> במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר	0.3-0.2	ריסוס להרטה של נוף הצמחים	בזנים בעלי צימוח נמרץ, אפשר לרסס ריסוס נוסף במידת הצורך.
גלוקסיניה	לאחר העברה לעציץ הסופי ולפני תחילת התארכות הגבעולים	0.1		כתוצאה מהריסוס באלאר, העלים מקבלים גוון כהה יותר ומתקבלת הקדמה בהופעת פקעי הפריחה
גרדניה	לאחר קיטום היחורים. ריסוסים נוספים במידת הצורך, אך לא יותר מ-2 טיפולים	0.7-0.35		בקיץ יש לרסס פעמים נוספות במידת הצורך
הורטנסיה (הידרנג'אה)	<b>טיפול קייצי:</b> 4 שבועות לאחר קיטום. <b>טיפול חורפי:</b> עם תחילת התפתחות ענפי הפריחה	0.8-0.6		הטיפול באלאר מעכב את הפריחה בכ-7 ימים
ברוד משובל (היפואסטס)	14-7 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.35-0.45		
ניצנית	לאחר הקיטום, בתדירות של אחת לשבועיים	0.6		
פיטוניה (נידי הכסף)	14-7 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.25-0.35		
סביון מלבין (צינוריה)	לאחר היווצרות פקעים או לפני התארכות גבעול הפריחה	0.3		
גידולי שתיל גוש: פיטוניה, ורונה, וינקה, טגטס, ציפורני-חתול	3-2 שבועות לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.5-0.3		

הגידול	מועד היישום	הריכוז (%)	נכח התרסיס ('ל/ד')	הערות
חרצית: לגידול פרחים קטופיים	<b>ריסוס 1:</b> 10 ימים לאחר הקיטום, או כאשר הפריצות באורך 2.5-4 ס"מ <b>ריסוס 2:</b> במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר <b>ריסוס 3:</b> בעונת הקיץ, בזנים בעלי עוקצי פרחים ארוכים, כאשר מופיעים פקעי הפריחה	0.3	50-30 לכיסוי מלא של קודקודי הצמחים	בחלקות המיועדות לטיפול באלאר, יש להתחיל את משטר היום הקצר מאוחר יותר, כאשר הגבעול ארוך ב-5 ס"מ מהמקובל
חרצית: ייצור יחורים במטע-אם	ריסוס כל 7 ימים	0.1-0.05 (הריכוז הגבוה בזנים בעלי צימוח נמרץ)		

רשימת השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 08/ה"צ/1978. מס' או"ם: לא מסווג.

