




CORTEVA™

זורבק אנקנטיה / زورقك اينكانتو / Zorvec Encantia

תחליב רחיק SE, מכיל: 300 ג'ל/ל Famoxadone + 30 ג'ל/ל Oxathiapiprolin



תכשיר להדברת מחוללי מחלות בירקות



זורבק אנקנטיה הינו קוטל פטריות סיסטמי משולב המכיל שני מרכיבים פעילים: אוקסתיאפיפרולין – קוטל פטריות מקבוצה כימית חדשה Piperidinyl (Thiazole) Isoxazoline, בעל מנגנון פעולה ייחודי. אוקסתיאפיפרולין הוא סיסטמי (נע בעצה), טרנסלמני, ולו פעילות מניעתית, קורטיווית וארדיקנטית. פמוקסדון – מעכב את תהליך הנשימה בפטריות הרגישות. יעיל בעיקר במניעה ובעיכוב של נביטת נבגי הפטריה. שני המרכיבים הפעילים מקנים לתכשיר פעילות משולשת – מניעת נגיעות ע"י עיכוב הנבגה ונביטת נבגים ופעילות קורטיווית וארדיקנטית הבאה לכלל ביטוי בעיכוב התפתחות תפטיר הפטריה ובהדברת תפטיר קיים.

רעילות לחי במים:	רעיל מאוד לחי במים, עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
רעילות לדבורים:	רעילות נמוכה לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה, בטרם התייבשו טיפות התרסיס על נוף הצמחים. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (III)

שילובים: בתפוח אדמה: קורזייט, סיגנום, סקור.

הוראות שימוש:

יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשוניים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים. אין ליישם זורבק אנקנטיה יותר מ-2 יישומים בעונה. משך פעילות התכשיר כ- 10 ימים. כאשר נעשה שימוש עוקב בזורבק אנקנטיה, אין ליישם במירווחים קטנים מ- 7 ימים.

הגידול	המחלה	המינון או הריכוז	נפח התרסיס (ל'ד')*	טיפול אחרון לפני אסיי/קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימסון	50 סמ"ק/ד'	30-20	10
			50-20	7
עגבנייה בשטח הגלוי	כימסון	0.05%	100-20	7
עגבנייה בהדליה בבתי צמיחה			80-25	3
מלפפון	כשותית הדלועיים	40 סמ"ק/ד'	80-25	3
בצל	כשותית הבצל	50 סמ"ק/ד'	בריסוס מהקרקה: 50-20 בריסוס מהאוויר: 5	7

* בהתאם לגודל הנוף.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבירקות מס': 19/ה'צ/ 4504. מס' או"ם: 3082.