



מנקור / منكور / Mancur

אבקה רטיבה, מכיל: Mancozeb 57.2% + Cymoxanil 14.2%

קוטל פטריות להדברת מחוללי מחלות בירקות

התכשיר מיועד לשימוש חקלאי בחממה ובשדה, להדברת מחוללי המחלות הבאות: כימיון בתפוח אדמה ובעגבנייה וכשוותית במלפפון, במלון, בחסה ובבצל. בטיפולים במנקור יודבר גם מחוללי המחלות חלפת וכתמי עלים אפורים (סטמפיליום). מנקוז מדביר את מחוללי המחלות (כשוותית, כימשון, חלפת וסטמפיליום) לפני חדירתם לצמח, אך אינו פוגע בהם בתוך הצמח. צימוקסניל הינו פונגיצידי סיסטמי קצר-פעולה, הנקלט תוך שעה בעלים ובגבעולים של הצמחים המרוססים ועל כן מוגן מפני שטיפה ע"י גשם או ע"י המטרה. צימוקסניל מדביר את הפטרייה גם לאחר חדירתה לצמח ועד כשלושה ימים לאחר ההדבקה, לפני הפעת התפסיר על פני העלה. שני הפונגיצידיים המשולבים בתכשיר מנקור משלימים זה את פעולתו של זה. התכשיר מנקור נמצא יעיל בהדברת גזעי כשוותית הדלועיים וכימשון הסולניים העמידים למטלקסיל. יש להתחיל בטיפולים מונעים טרם הפעת המחלה ולהמשיך לרסס מדי שבוע כל עוד קיימים תנאים מתאימים להתפתחות המחלות.

רעילות לחי במים:	רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.
רעילות לדבורים:	התכשיר רעיל מאד לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	מותרת אך ורק לאחר התייבשות התרסיס ע"ג עלוות הגידול התרבותי
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים: אין לשלב מנקור בתכשירים אחרים.

הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	המינון (ג'ד')*	נפח התרסיס (ל'ד')	המירווח בין הריסוסים (בימים)	יישום אחרון לפני אסיף / קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימשון הסולניים, חלפת הסולניים	350-250*	50-30	7	3
	* המינון הנמוך מיועד לטיפול מניעה או לריסוס ברמת נגיעות נמוכה, על צמחים צעירים. יש להעלות המינון בתחום המומלץ במקביל להתפתחות הצמחים ובהתאם לעוצמת הנגיעות.				
עגבנייה בשדה גלוי ובגידול חסוי	כימשון הסולניים, חלפת הסולניים, כתמי עלים אפורים (סטמפיליום)	350	100-20	7	5
מלפפון ומלון בשדה גלוי ובגידול חסוי	כשוותית הדלועיים, חלפת הדלועיים	350	100-20	7	5
חסה	כשוותית החסה, כתמי עלים חומים (סטמפיליום)	350	50-30	7	7
בצל	כשוותית הבצל, חלפת סגולה בבצל, כימשון שקעים (סטמפיליום)	350	30-20	7	7

רשיון השיירותיים להגנת הצומח ולביקורת מס': 86/ה"צ/930. מס' או"ם: 3077.

