




# סימוקסן / סימוקסין / Cymoxan

גרגרים רחפים, מכיל: 60% Cymoxanil



## קוטל מחולי מחלות בסולניים

סימוקסן הינו תכשיר טיסטמי קצר פעולה המדביר את מחולל מחלת הכימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה. המרכיב הפעיל סימוקסניל, נקלט במהירות תוך כשעה בעליו ובגבעולים של הצמחים המרוססים, משלב זה מוגן התכשיר משטיפיה ע"י גשם או ע"י המטרה. סימוקסן מדביר את מחולל מחלת הכימשון גם לאחר חדירתה לצמח עוד לפני הופעת תפטיר.

<b>רעילות לחי במים:</b>	רעיל מאוד לחי במים עם הפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
<b>רעילות לדבורים:</b>	התכשיר רעיל לדבורים. באיזורים ובשעות בהם יש פעילות ל דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים. כוורת של דבורי בומבוס יש לסגור לפני הריסוס ועד 3 שעות לאחר גמר הריסוס. אין צורך להוציא כוורת מהשטח בזמן היישום. התכשיר רעיל לאויבים טבעיי
<b>כניסה מחדש לשטח המטופל:</b>	12 שעות. לאחר ריסוס בבתי צמיחה או במנהרות עבירות יש לאפשר אוורור נוסף של 12 שעות ע"י הפשלת יריעות הפלסטיק או הפעלת מאווררים
<b>דרגת רעילות:</b>	מסוכן לבריאות (III)

### הוראות שימוש:

הריסוסים יינתנו בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות וחדירה מירבית לטף הצמחים בכלים המאושרים לכך. סימוקסן ניתן ליישום תחת חיפוי ובשטח הפתוח

הגידול	המחלה	המינון* (ג'ד')	נפח התרסיס** (ל'ד')	שילובים	יישום אחרון לפני אסוף/קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימשון	80-60 בשילוב עם קוטל פטריות נוסף	50-20	נוגל	12
עגבנייה			100-20		3

\* מרססים במינון הנמוך בטיפול מניעה או כשרמת הנגיעות נמוכה.  
\*\* יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות. נפח תרסיס גבוה מיועד לשטחים בהדלייה.

רישיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 15 / ה"צ / 4184. מס' או"ם: 3077.

