



סימוקסן סימוקסין Cymoxan

כללי: סימוקסן הינו קוטל פטריות סיסטמי קצר פעולה, המדביר את מחולל מחלת הכימסון בתפוח אדמה ובעגבנייה. המרכיב הפעיל, סימוקסין, נקלט במהירות תוך כשעה בעלוה ובגבעולים של הצמחים המרוססים, משלב זה, מוגן התכשיר משטיפה ע"י גשם או משטיפה ע"י המטרה. סימוקסן מדביר את הפטריה גם לאחר חדירתה לצמח עוד לפני הופעת תפטיר.

אזהרות: מזיק בבליעה. גורם לגירוי בעור ועלול לגרום לריגוש בעור. חשוך כפוגע בפוריות או בעובר אדם. לא לשימוש לנשים בגיל הפוריות. עלול לגרום נזק למחזור הדם ולבלוטת התימוס, עקב חשיפה חוזרת ונשנית.

אזהרות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים. כוורות של דבורי בומבוס יש לסגור לפני הריסוס ועד 3 שעות לאחר גמר הריסוס.

אין צורך להוציא כוורות מהשטח בזמן היישום.

אופן היישום:

סימוקסן ניתן בשטח הגלוי ובשטח החסוי.

הגידול	המחלה	המינון *(ג'/ד')	נפח התרסיס** (ל'/ד')	שילובים	טיפול אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימסון	80-60 בשיילוב עם קוטל פטריות נוסף	50-20	נוגל	12
עגבנייה			100-20		3

* מרססים במינון הנמוך בטיפול מניעה או כשרמת הנגיעות נמוכה.

** יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלוה והפירות. נפח תרסיס גבוה מיועד לחלקות בהדלייה.

המירווח בין הריסוסים: 5-10 ימים בהתאם לרמת הנגיעות. אין לרסס יותר מ-7 פעמים בשנה. רגיש לפירוק בתנאים בסיסיים (pH גבוה מ-7) אין לשלבו עם קוטלי פטריות בסיסיים.

אין לרסס סימוקסן לבד. מיועד לריסוס בשיילוב קוטל פטריות נוסף המתאים לכך.

ניקוי ציוד היישום: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את ציוד היישום וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חוב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.

כניסה מחדש לחלקה המטופלת: 12 שעות. לאחר ריסוס בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות, ע"י הפשלת יריעות הפלסטיק או הפעלת מאווררים.

GADOT משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
Agro המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500. טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

עידון תווית: 03/2022 | 515061320050001

אחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר, מוצל, ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממצרכי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חוב.

טיפול באריזות ריקות: יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מכל המרסס ולהשליך את האריזה לאשפה.


עזרה ראשונה: • במקרה של שאיפת התרסיס או אבק התכשיר, פנה את הנפגע לאזור מאוורר היטב. פנה לרופא אם אינך חש בטוב. • במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד את העיניים במים נקיים במשך מספר דקות. פנה לרופא אם התפתח גירוי. • במקרה של בליעה, יש לפנות מיד לרופא. אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. • במקרה של מגע בעור, הסר מיד בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר.

מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.



סימוקסן Cymoxan סימוקסין

גרגרים רחיפים WG - קוטל מחוללי מחלות בסולניים
מכיל: Cymoxanil 60%



קבוצה 27 קוטל פטריות

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | מס' או"ם: 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4184/צ"ה/15

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط



אין לרסס סימוקסן לבד!
מיועד לריסוס בשיילוב
קוטל פטריות נוסף המתאים לכך.

תכולה: 5 ק"ג

Willowood Limited, Hong Kong ע"י: Willowood
משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500. טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

עידון תווית: 03/2022 | 515061320050000

