




סינבר / سينبار / Sinbar

אבקה רטיבה, מכיל: Terbacil 80%

Tessenderlo
KERLEY



קוטל עשבים שאריתי, בררני במנטה ובגיבסנית



סינבר פעיל במניעת ההצצה וכן בהדברת עשבים קיימים בשלבים מוקדמים שלאחר ההצצה. התכשיר נקלט בעיקר ע"י מערכת השורשים ונע באופן סיסטמי אל אתר הפעולה - העלים. התכשיר מתחיל לפעול רק לאחר הצנעה בגשם או בהמטרה. מסיסותו של התכשיר במים גבוהה יחסית. באדמות קלות, בתנאים של השקיות תכופות, הוא עלול להישטף לעומק. בחלקות המושקות בטפטוף עלול התכשיר להידחק לשולי אזור ההרטבה של הטפטפות, ובכך תיפגם פעילותו השאריתית במניעת הצצה. בתנאים אלה מומלץ ליישמו רק לאחר הצצת העשבים. הפעלת התכשיר תיעשה בכל מקרה בגשם או בהמטרה.

רעיל לחי במים:	רעיל מאוד ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות. טווח בסביבה המימית. מנע זרימה לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לחלקה המטופלת עד להתייבשות מלאה של התרסיס על העלווה. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

גידולים עוקבים במחזור: סינבר הינו תכשיר שאריתי. אי לכך יש להימנע מזריעה או משתילה של כל גידול תרבות אחר חוץ ממנטה או גיבסנית, בטרם חלפו שנתיים ממועד הריסוס האחרון בסינבר.

הוראות שימוש:

הערות	נפח התרסיס (ל/ד')	המינון (גר/ד')	מועד היישום	
			עשבייה חד-שנתית	הגידול
1. הפעלת התכשיר תיעשה ע"י גשם או ע"י המטרה לא יאחר משבועיים לאחר הריסוס.	50-20	100	קדם הצצה או אחר הצצה, כאשר גובה העשבים לא עולה על 15 ס"מ	מנטה: לאחר השתילה וקליטת השתילים /או לאחר הקציר
2. אין לרסס כאשר הגידול נמצא בעקה כלשהי. 3. אפשר לרסס סינבר במנטה לא יותר מפעמיים בשנה. 4. בגיבסנית ניתן לרסס סינבר גם לאחר שהשטח רוסס ברונסטאר בטיפול קדם-שתילה או לאחר הגיזום	50-20	75-50	אחרי הצצת העשבים, כאשר גובהם לא עולה על 15 ס"מ. בקרקע כבדה אפשר לרסס עוד לפני הצצת העשבים	גיבסנית: שתילה חדשה: החל מ-3 שבועות לאחר השתילה ועד תחילת פריחה. בגיזום: מיד לאחר הגיזום ועד לתחילת פריחה

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 86/צ"940. מס' או"ם: 3077.