




עמירן / عميران / Amiran

תרכיז רחיק, מכיל: 250 גרם בליטר Azoxystrobin



להדברת מחוללי מחלות בירקות ובגפן

קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמיני מקבוצת הסטרובילורנים.

עמירן מעכב את נשימת הפטריות הפתוגניות ולפיכך הוא מתאים לשימוש לחלופין עם תכשירים בעלי מנגנוני פעולה אחרים.

* הוראות יישום לטיפול הגמעה:

1. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בעמירן כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה
2. אין ליישם במצע מנותק
3. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים וארוטכניקה)
4. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר השקיה
5. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר, יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 מ"ק מים לדונם לאורך כל ההשקיה
6. לאחר היישום יש להזרים 1 מ"ק מים לדונם לשטיפת המערכת
7. עלול לגרום לתסמיני מחסור בעלים

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות, מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	4 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש בנוסף לאזורר בשיטות המקובלות עוד 12 שעות לפני הכניסה מחדש
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 15/ה"צ/4199. מס' או"ם: 3082.

טבלת המינימום:



הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד' או הריכוז (ל' ד'))	נפח התרסיס (ל' ד')	יישום אחרון לפני אסיף/ קטיף/ בציור (ימים)	הערות
גזר	קימחון הגזר	50-25	35-20	15	המינון הנמוך ממולץ במקרה של טיפולי מניעה או בתחילת נגיעות
	חלפת הגזר	25			
תפוז"א	נימור שחור (ריזוקטוניה סולני)	100 סמ"ק ל-1000 רץ גדודית	25	90	יישום בפס הזריעה במהלך הזריעה
	חלפת הסלונים	25			
עגבנייה, פלפל	קימחונית	150	בהגמעה *	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים, יישום ראשון מומלץ כחודש לאחר שתילה
בצל	כשותית הבצל, כימשון השקעים (סטמפיליום)	50	30-20	15	יש להקפיד על מירווחים של 7-10 ימים בין יישום ליישום
גפן	כשותית הגפן, קימחון הגפן	0.05%	150-100	15	טיפול מניעה