



# פלורמיט® 240SC FLORAMITE®

## תרכיז רחיק

**קוטל אקריות בפרחים, בירקות ובעצי פרי**  
מכיל: 240 ג'/ל Bifenazate

קבוצה: 20D קוטל חרקים

**נער היטב את הבקבוק לפני השימוש**  
**דרגת רעילות: מסוכן (IV) | מס' או"ם: 3082**  
**רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 02/ה"צ/1683**  
**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**  
**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד**  
**ליס לא ללאסְתְעֵמֵל אֲרֵצֵנוּ - לא ללאסְתְעֵמֵל אֲרֵצֵנוּ**

**תכולה: 1 ליטר**

מיוצר על ידי: CJB Agriculture, ארה"ב  
עבור MacDermid Industrial Solutions, ארה"ב

**מט"ס סדרת ייצור:**



**GADOT Agro**

המשרד: מתחם גדות אגרו  
ת"ד 555, קדרון 7079 500  
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

**הערה:** המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המיועדות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המציינות בתווית או בתנאי שימוש ביתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לציפייה על המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.



**כללי:** פלורמיט הנון קוטל אקריות המיועד להדברת אקריות קורים בפרחים וברקות הגדלים בחממות, בבתי רשת ובשטח הפתוח וכן, להדברת אקריות צהובה של עצי-פרי נשירים ואקריות אירופית בעצי פרי. פלורמיט משתייך לקבוצה כימית Carbazate. אתר פעולתו במערכת העצבים של האקריות. פלורמיט נקלט בגוף האקריות במגע קוטל במהירות יחסית את הדרגות הנעות של האקריות. פלורמיט ניתן ליישום בכלי הריסוס המומלצים, המאפשרים כיסוי מלא של העלווה וחדירה מרבייה אל הנוף הסובב. אין לרסס את התכשיר בנפחי תרסיס נמוכים. כדי להפחית את הסיכון לפיתוח

תנגודת, חשוב לנקוט בגישה של ריסוסים חלופיים בתכשירים המורשים לכך ובמירווחי הריסוס המומלצים. כמו כן יש להגביל את מספר הריסוסים בפלורמיט לשני טיפולים בעונה בלבד. לעניין זה ריסוסים עוקבים בפלורמיט במירווח של פחות מ-7 ימים נחשבים לטיפול יחיד בתכנית ההדברה. בעקבות טיפול בפלורמיט יבואו במעקבים שני טיפולים חלופיים אחרים. לפלורמיט רעילות נמוכה לאקריות טורפות ולחרקים מעוילים: *Aphidius colemani*, *Diglyphus isaeae*, *Orius laevigatus*, *Aphidius colemani*, *Phytoseiulus persimilis*, *Typhlodromus aptisaeae* (i.P.M).  
**■ אזהרות:** מסוכן בבליעה. התכשיר עלול לגרום לריגוש בעור (אלרגיה) וכן לגרום בעיניים.  
**■ אמצעי הירוח ומיגון:** בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן היישום לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים, ניטריל (לפי תקן EN-374/3), משקפי

**■ אופן השימוש:**

מגן עם מגני צד (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. נמנע מגע של התכשיר או של התמיסה המומכה עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את אדי התכשיר או אדי התמיסה. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.  
**■ רעילות לסביבה:**  
**■ רעילות לדגים:** רעיל לחי במים, עלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה מימית.  
**■ רעילות לדבורים:** לתכשיר רעילות בינונית לדבורים. עם זאת, במינונים המומלצים ובשיטות היישום המומלצות, פלורמיט אינו פוגע בדבורים.  
**■ הרואות שימוש:**  
**■ הכנת התרסיס:** נער היטב את הבקבוק לפני השימוש. המלא כדי מחציתו מים, מפעילים את הבוחש ומשלימים לנפח הנדרש. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום.

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז והנפח התרסיס	הערות	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
פרחים: ורד, ציפורן, סולידגו, אסטר, צלוזיה, לוט-ארי, גיבסנית, חמנית, סיפון, חרצית	אקרית אדומה מצויה	75-50 סמ"ק/ד' בפנח תרסיס של 50 עד 100 ל"ד/א או 0.05%-0.75% בפנח תרסיס גבוה מ-100 ל"ד/א	יש להתחיל בריסוסים בסף נגיעות נמוך מיד עם הופעת האקריות בחלקה.	-
	אקרית האספרג	המינון או הריכוז הנמוך ברמת נגיעות התחלתית נמוכה או כאשר נדרשים שני יישומים עוקבים בתכשיר	ביגודים בהם העלווה צפופה או במקרים של נגיעות קשה ושילוב דורות של המזיק יש לחזור על הטיפול שנית כעבור 7 ימים.	3
אספרגוס וריגוס	אקרית אדומה מצויה	0.05% בפנח תרסיס גבוה מ-100 ל"ד/א	מאחר והתכשיר אינו סינטיטי יש לרסס בפנח שיבטיח כיסוי מלא של העלווה וחדירה אל נוף הצמחים המרוססים.	7
ירקות: עגבניה, פלפל, חציל	אקרית אדומה מצויה	0.06% בפנח של 100-200 ל"ד/א בהתאם לגובה העצים	אין לרסס פלורמיט יותר מפעמיים בעונה.	15
מלון	אקרית אדומה מצויה	0.06% בפנח של 100-200 ל"ד/א בהתאם לגובה העצים		14

**\* פירוט רשימת זני הפרחים: רוד** - כרמן, פינק טנגו, רוזה אינדיקה, נובלס, פריסקו, ששה, למבדה, אספריט, באלט, ניקול, טיניקה, מורק, סובייר, גולדן גייט, רול, בלק מג'יק, בל רוז, אנה יורג'יניה, לאונידס, בלק בקר; **ציפורן** - ווייט דונה, סוארג, ליני, פמלה, לילה, טונדרה, מזאלגה, דובטלו; **סולידגו** - טרה; **אסטר** - קוזלוקה, סאן קרלו, סאן פלאם, סאן גאל, סאן טאי, דיאנה קינג וויט, כחול שוליים, פרפל; **צלוזיה** - ציף; **לוט ארי** - פוטומה, וינטר לבן; **גיבסנית** - מיליון סטארס, פרפקטה, בלנקה נוויס; **חמנית** - אורית, ירושלים; **סיפון** - מסטרס; **חרצית** - קלבריה, רינג, הייפיי, וירג'ינה, יוקו, אונו, אלן וואן לאנג, בובי, טרהמטיק, דרורה, ריי-פוקוס, רמיקס, שינה, ציקס, בלינדה, דרמטיק, רד בויט, אלגרו אורנג', ריפיקוס רד, בניג'ולינג, בריז, קליסק.



**■ שילובים:** פלורמיט נבדק ונמצא בטוח בשילובים עם התכשירים הבאים: **ורד**: BB-5; **ציפורן**: ספידה; **סולידגו**: אופיר, אוונט, טריגרד; **גיבסנית**: טריגרד; **חמנית**: טריגרד; **סיפון**: טריגרד; **חרצית**: אוואנט; **עגבניה**: מיתוס, סקור, פולאק, קליפמן, שביט, אוואנט, אוויסקט, אפולו, מיץ, ספידה, פגוסוס 250; **פלפל**: אופיר, פולאק, שביט, אוואנט, אוויסקט, ורטימק, טלסטאר, מיץ, ספידה, פגוסוס 250; **חציל**: ספידה, **מלפפון**: ספידה פיראטי; **אבטיח**: ספידה; **מלון**: ספידה; **תות-שדה**: אפולו, נפרד עם זאת בהתחשב בתנאים המיוחדים באזורים השונים ובמגוון שיטות הגידול, חובה על המשתמש לבצע בדיקת כושר השתלבות ובטיחות מקדימה בקנה מידה מצומצם לפני ביצוע הריסוס המשקי.

**בגמר השימוש:**  
**■ ניקוי ציוד הריסוס:** בגמר הריסוס, יש לרוקן את המכל מאשריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.  
**■ סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה. כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר טיהור אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.  
**■ הגנה אישית בגמר העבודה:** בתום העבודה התרחץ היטב והחלף בגדיך. בגדים מזוהמים כבס נפרד משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. **■ מונע כניסה מחדש:** 12 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. **■ אחסון:** אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, מוצל, קריר ויבש, המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידים של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבסוף ליבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל, צרכי האבסה, זרעים, דשנים וכיו"ב. לאחר כל שימוש, סגור היטב את האריזה המקורית. **■ טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג באמצעות חול או נסורת ולאסוף לכלי סגור תכשיר שנשפך שפג תקופו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת ויחייב פינוי לאתר פסולת רעילה. **■ טיפול באריזות ריקות:** בקבוק שהתרוקן, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מכל הריסוס. נקב ומנר את הבקבוק השטוף והשלך אותו לפח האשפה. **■ עזרה ראשונה:** במקרה של מגע בעור, שטוף את העור שבא במגע עם התכשיר במים ובסבון, אם יש צורך פנה לרופא. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף את העין במים זורמים נקיים במשך 15 דקות. ולפנות לרופא. במקרה של שאיפת אדי התכשיר יש להתפנות לאוויר צה, ולפנות לרופא. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה, יש לפנות לרופא מיד. **■ מידע לרופא:** במרכז הרצפי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל: 04-7771900.