



קוז'אק / كوجاك / Kojack

תרכיז רחיק, מכיל: 125 גרם בליטר Flutriafol

江苏丰登作物保护股份有限公司
JIANGSU FENGDENG CROP SCIENCE CO.,LTD



להדברת מחוללי מחלות בעצי פרי, בירקות ובפרחים

קוז'אק הינו קוטל פטריות סיסטמי מקבוצת הטריאזולים המיועד להדברת מחוללי מחלות בהדרים, במנגו, בגר ובתפוח אדמה.

רעילות לחי במים:	רעיל לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום לזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
רעילות לדבורים:	רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	לאחר התייבשות מלאה של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (III)

שילובים: אין לשלב קוז'אק בתכשירים נוספים

עמידות: אין להשתמש בקוז'אק ברציפות, אלא כחלק ממשטר טיפולים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו. אין ליישם קוז'אק, יותר מ- 3 פעמים בשנה

הוראות שימוש:

א. ריסוס עלווה - הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים. מנע רחף לגידולי תרבות שכנים.

גידול	המחלה	המינון או הריכוז	נפח התרסיס	יישום אחרון לפני אסיף/ קטיף (מים)
גזר	חלפת הגזר, קימחון הגזר	75 סמ"ק לדונם	25-30	7
תפוח- אדמה	חלפת הסולניים	75 סמ"ק לדונם	25-30	7
הדרים	כתמי חלפת	0.15%	להרטבה מלאה	120
מנגו	קימחון המנגו	0.05%	להרטבה מלאה	60
שעויות מאונקלת (פרח השעווה)	קימחונית	0.05%	להרטבה מלאה	

ב. טיפולי הגמעה

גידול	המחלה	המינון	נפח התרסיס	יישום אחרון לפני קטיף (מים)
פלפל	קמחונית	100 סמ"ק ד'	הגמעה יישום ראשון: חודש-חודש וחצי אחרי שתילה לפני הופעת המחלה יישום שני: כחודש אחרי הטיפול הראשון	3

רשיון השירותים להגנת הצמח ולביקורת מס': 09/ה'צ/1957. מס' או"ם: לא מסווג.