



קוטל פטריות וחיידקים למניעת מחלות בצמחים

- 1 - הריכוז הגבוה בעגבניות מפותחות.
- 2 - הריכוז הנמוך בטיפול מניעה, מגדילים את הריכוז עם הופעת הנגיעות והתעצמותה.
- 3 - יעילות הטיפול מהאוויר נפלת מזו של הטיפול מהקרקה יש לנקוט בו רק כאשר אין אפשרות לטפל מהקרקה.
- 4 - הריכוז הגבוה מומלץ בחלקות בהן הנגיעות בעבר הייתה גבוהה.
- 5 - ריסוס ראשון בראשית אוקטובר והשני בסוף דצמבר. ריסוסים נוספים, במידת הצורך, יינתנו בינואר-מרס.
- 6 - יש להתחיל לרסס במניעה לפני סגירת הנוף ולהמשיך ולרסס במירווח של 7-10 ימים (המירווח הגדול במניעה).
- 7 - בהתאם למעקבות הריסוסים המומלצת להדברת אלטרנריה. הריסוסים יינתנו במירווח של 14 יום.
- 8 - בשלב תרדמה ולא יאוחזר מתחילת בצבוצ ירוק. בתפוח אין לרסס לאחר תחילת בצבוצ ירוק, ריסוס מאוחר יותר עלול לגרום לחספוס בפרי.
- 9 - באגס בתקופת הפריחה, הריסוסים יינתנו בריכוז 0.08% מתחילת הפריחה ויימשכו עד סיומה במירווח של 5-6 ימים.
- 10 - יש להתחיל ולרסס לפני הופעת המחלה (מניעה) במירווח של עד 7 ימים. עם הופעת המחלה יש לצופף את הטיפולים לפעמיים בשבוע. יש לשלב בתוכנית הריסוסים תכשירים נוספים מומלצים היעילים בהדברת הפטרייה כמו קורזייט, מנקור, סכיר ועוד.
- 11 - במינן 100 יש לשלב שמן נימגארד בריכוז 2%.
- 12 - בהתאם לגודל הנוף.
- 13 - יש להתחיל בריסוסים לפני הופעת הנגיעות במחלה ולהמשיך שבועיים עד שלושה בהתאם להמלצות יש להקייד ולרסס לתוך הלולב ולתוך לב העץ.

רשיון השירותים להגנת הצומח וליבוקרת מס': 03/ה"צ/1721. מס' או"ם: 3077.  
מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רשיון מס': 7342.  
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקני NOP מס': 11001.



רעילות לכבשים:	אין לאפשר רעיית צאן בשטחים שטופלו בתכשירי נחושת
רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
רעילות לדבורים:	התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה לפני חלוף 48 שעות מהריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (III)

**שימושים:** כאשר משלבים תכשיר נוסף יש להוסיפו למכל המרסס רק לאחר הכנסה וערבוב של קוציד 2000. בחקלאות האורגנית מותר לשלב אך ורק תכשירים המאושרים לחקלאות אורגנית.

הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	הריכוז או המינן	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום אחרון לפני אסוף/קטיף (ימים)
עגבנייה	ניקוד חיידקי	0.04%-0.25% <sup>1</sup>	50-30	
	כימשון <sup>10</sup>	200-100 (ג'ד') <sup>11</sup>	50-30 <sup>12</sup>	
פלפל	כתמי עלים חיידקיים	0.04%-0.25% <sup>2</sup>	50-30	
	ריקבון רך חיידקי <sup>6</sup>	200 (ג'ד')	30-10	
תפוח-אדמה	כימשון <sup>10</sup>	200-100 (ג'ד') <sup>11</sup>	40-20 <sup>12</sup>	
	כתמים מצולעים בדלועיים	0.25%	50-30	
מלפפון, מלון	קימחון הגזר, חלפת הגזר	200 (ג'ד')	40-10	
	קימלון (מאל-סקו)	0.25%	400-200	
הדרים	כתמי חלפת <sup>7</sup> (אלטרנריה)	0.25%	400-200	
	ריקבון חום	0.25%	200	
	ריקבון חום	ריסוס מהאוויר 800 גר/ג'ד <sup>3</sup>	15	
	החמה	0.25%-0.16% <sup>4</sup>	400-200	
תפוח (עד בצבוצ ירוק)	חירכון <sup>8</sup>	0.25%	150-100	
אגס (עד בצבוצ ירוק)	חירכון <sup>8</sup>	0.25%	150-100	
אגס (בפריחה)	חירכון <sup>9</sup>	0.08%	150-100	
זית	עין הטווס <sup>5</sup>	0.25%	להרטבה מלאה	
גפן	נשותית הגפן	0.25%	להרטבה מלאה	
מנגו	השחרה חיידקית	0.25%	להרטבה מלאה	
	השחרה חיידקית	ריסוס מהאוויר 480 (ג'ד') <sup>3</sup>	20	
תמר <sup>13</sup>	כווייה שחורה (Chalara paradoxa)	0.5%	להרטבה מלאה	