

קוציד 2000® كوسايد

גרגרים רכיפים WDG

קוטל פטריות וחיידקים למניעת מחלות בצמחים

קוטלי פטריות וחיידקים

M1

קבוצה



מכיל: Copper Hydroxide 53.8%
(מתאים ל-35% נחושת מתכתית)

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מס' או"ם: 3077



רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1721/ה"צ/03

מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רשיון מס': 7342

מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקני ASP מס': 11001

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

תכולה: 10 ק"ג

תנאי מכירה: אנו משוכנעים ביעילותו של התכשיר בהתאם לניסויי שדה שנערכו על ידינו. אף על פי כן, מובא בזאת לידיעת המשתמש בתכשיר, כי יעילות זאת מושפעת ממשתנים שונים כגון: גורמים סביבתיים למיניהם, התפתחות תנגודת וכדומה. יש להקפיד על קיומם המדויק של כל הוראות השימוש ואמצעי ההירות. מאחר ואין באפשרותנו לפקח על אופן השימוש בתכשיר ומשתנים נוספים בשטח, אין אנו אחראים לתוצאות ולנזקים העלולים להיגרם מהשימוש בתכשיר, הן לפי הוראות אלה והן לפי כל אופן שימוש אחר

עידכון תווית: 08/2024 | 519061850100000

A20230048 IL

מיוצר ע"י: Cosaco, ארה"ב



מס' סדרת ייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.

משוקק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו
ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001
www.gadotagro.com



הוראות שימוש:

אזהרות: רעיל בבליעיה. מזיק בשאיפה. גורם נזק חמור לעיניים. מזיק במגע עם העור.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש גדי עבודה ארוכים - סרבל עמיד לחדירת חומרים כימיים, כסויות גומי עמידות לכימיקלים (תקן EN-374/3). כובע או כיסוי לשיער, מגפי גומי, מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3, משקפי מגן אטימים מהצדדים (תקן EN-166), מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. הימנע משאיפת התרסיס או אבק התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.

סכנות לסביבה:

התכשיר רעיל לכבשים: אין לאפשר רעיית צאן בשטחים שטופלו בתכשירי נחשת.

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים.

ריסוס מהאוויר: לא יפזר אדם, במישרין או בעקיפין, רעל או כימיקל מכלי טיס:

(1) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו.

(2) מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה.

(3) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך.

כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	הריכוז/המינון	נפח התרסיס (ל' / ד')	טיפול אחרון לפני אסיף/קטיף/ מסיק/בציר/גדיד (ימים)	
עגבנייה	ניקוד חיידקי	0.25%-0.4% ¹	30-50	7	
	כימשון ¹⁰	100-200 גר"/ד'	30-50 ¹²		
פלפל	כתמי עלים חיידקיים	0.25%-0.4% ²	30-50	7	
תפוח אדמה	ריקבון רך חיידקי ⁶	200 גר"/ד'	10-30		
	כימשון ¹⁰	100-200 גר"/ד'	20-40 ¹²		
מלפפון, מלון	כתמים מצולעים בדלועיים	0.25%	30-50	7	
גזר	קמחון הגזר, חלפת הגזר	200 גר"/ד'	10-40		
הדרים	קימלון (מאל-סקו)	0.25%	200-400	7	
	כתמי חלפת (אלטרנריה) ⁷	0.25%	200-400		
	ריקבון חום		0.25%		200
		ריסוס מהאוויר ³	800 גר"/ד'		15
	החמה	0.16%-0.25% ⁴	200-400		
תפוח (עד בצבוץ ירוק)	חירכון ⁸	0.25%	100-150	7	
אגס (עד בצבוץ ירוק)	חירכון ⁸	0.25%	100-150		
אגס (בפריחה)	חירכון ⁹	0.08%	100-150	7	
זית	עין טווס ⁵	0.25%	להרטבה מלאה		
גפן	כשותית הגפן	0.25%			
מנגו	השחרה חיידקית	ריסוס מהאוויר ³	20	7	
		480 גר"/ד'			
תמר ¹³	כווייה שחורה (Chalara paradoxa)	0.5%	להרטבה מלאה		

1. הריכוז הגבוה בעגבניות מפותחות.

2. הריכוז הנמוך בטיפול מניעה, מגדילים את הריכוז עם הופעת הנגיעות והתעצמותה.

3. יעילות הטיפול מהאוויר נופלת מזו של הטיפול מהקרקה ויש לנקוט בו רק כאשר אין אפשרות לטפל מהקרקה.

4. הריכוז הגבוה מומלץ בחלקות בהן הנגיעות בעבר היתה גבוהה.

5. ריסוס ראשון בראשית אוקטובר והשני בסוף דצמבר. ריסוסים נוספים, במידת הצורך, יינתנו בינואר-מרס

6. יש להתחיל לרסס במניעה לפני סגירת הנוף ולהמשיך ולרסס במירווח של 7-10 ימים (המירווח הגדול במניעה).

7. בהתאם למעקבות הריסוסים המומלצת להדברת אלטרנריה. הריסוסים יינתנו במירווח של 14 יום
8. בשלב תרדמה ולא יאחר מתחילת בצבוץ ירוק. בתפוח אין לרסס לאחר תחילת בצבוץ ירוק. ריסוס מאוחר יותר עלול לגרום לחיספוס בפרי.
9. באגס בתקופת הפריחה, הריסוסים יינתנו בריכוז 0.08% מתחילת הפריחה ויימשכו עד סיומה במירווח של 5-6 ימים.
10. יש להתחיל ולרסס לפני הופעת המחלה (מניעה) במירווח של עד 7 ימים. עם הופעת המחלה יש לצופף את הטיפולים לפעמיים בשבוע ולשלב בתוכנית הריסוסים תכשירים נוספים מומלצים, היעילים בהדברת הפטריה כמו פוליו גולד + קורזייט, מנקור, סכיור, קליפמן ועוד.
11. במינן 100 יש לשלב שמן נימגארד בריכוז 2%.
12. בהתאם לגודל הנוף.
13. יש להתחיל בריסוסים לפני הופעת הנגיעות במחלה ולהמשיך שבועיים עד שלושה בהתאם להמלצות יש להקפיד ולרסס לתוך הלולב ולתוך לב העץ.

שילובים: כאשר משלבים תכשיר נוסף יש להוסיפו למכל המרסס רק לאחר הכנסה וערבוב של קוציד 2000. בחקלאות האורגנית מותר לשלב אך ורק עם תכשירים המאושרים לחקלאות אורגנית.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס, להחליף בגדים ולכבסם בנפרד.

כניסה מחדש לחלקה המטופלת: אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה לפני חלוף 48 שעות מהריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: שמור את התכשיר באריזתו המקורית, במקום מוגן, נעול ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. מנע מגע של התכשיר עם חומרי מזון או עם מספוא

במקרה של התפזרות התכשיר: לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת, החייבת פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול בתכשיר שהתפזר: וודא שבשקית לא נותרו שאריות של תכשיר ולאחר מכן השלך אותה לפח האשפה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את השקית היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מכל המרסס. נקב ומעך את השקית השטופה והשלך אותה למכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה:

במקרה של מגע **בעיניים**, שטוף במים למשך מס' דקות, הסר עדשות מגע, פנה לרופא אם התפתח גירוי. במקרה של **שאיפה**, פנה את הנפגע לאוויר הצח והשאר אותו במנוחה, בתנוחה נוחה לנשימה. הזעק מיד טיפול רפואי.

במקרה של **בליעה**, שטוף את הפה ולאחר מכן שתה הרבה מים. אין לגרום להקאה. פנה מיד לרופא. במקרה של מגע **בעור**, שטוף במים ובסבון. פנה לרופא אם התפתח גירוי.

מידע לרופא: במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

קוציד 2000® كوسايد

גרגרים רכיפים WDG

קוטל פטריות וחיידקים למניעת מחלות בצמחים

קוטלי פטריות וחיידקים

M1

קבוצה



מכיל: Copper Hydroxide 53.8%
(מתאים ל-35% נחושת מתכתית)

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מס' או"ם: 3077



רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1721/ה"צ/03
מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רשיון מס': 7342
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקני ASP מס': 11001



קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

תכולה: 10 ק"ג

תנאי מכירה: אנו משוכנעים בעילותו של התכשיר בהתאם לניסויי שדה שנערכו על ידינו. אף על פי כן, מובא בזאת לידיעת המשתמש בתכשיר, כי יעילות זאת מושפעת ממשתנים שונים כגון: גורמים סביבתיים למיניהם, התפתחות תנגודת וכדומה. יש להקפיד על קיומם המדויק של כל הוראות השימוש ואמצעי ההירות. מאחר ואין באפשרותנו לפקח על אופן השימוש בתכשיר ומשתנים נוספים בשטח, אין אנו אחראים לתוצאות ולנזקים העלולים להיגרם מהשימוש בתכשיר, הן לפי הוראות אלה והן לפי כל אופן שימוש אחר

מיוצר ע"י: Cosaco, ארה"ב



מס' סדרת ייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו
ת"ד 555, קדרון 7079500
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001
www.gadotagro.com



יודכן תווית: 08/2024 | 519061850100000

IL A20230047