




קורזיט / קורזיט / Curzate

גרגרים רחפים, מכיל: 60% Cymoxanil



קוטל מחוללי מחלות בצמחים, סיסטמי, להדברת כימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה, המיועד לריסוס אך ורק בתערובות עם קוטלי מחוללי מחלות בצמחים אחרים המורשים לכך



קורזיט הינו קוטל מחוללי מחלות בצמחים סיסטמי קצר פעולה. החומר הפעיל, סימוקסניל, נקלט תוך שעה בעלים ובגבעולים של הצמחים המרוססים ומשלב זה מוגן התכשיר מפני שטיפה ע"י גשם או ע"י המטרה. סימוקסניל מדביר את מחולל המחלה גם לאחר חדירתו לצמח ועד כשלושה ימים לאחר ההדבקה, עוד לפני הופעת תפטיר על פני העלה. אין לרסס קורזיט לבד. קורזיט מיועד לריסוס בשילוב קוטל פטריות נוסף המתאים לכך בהתאם להמלצות (ראה טבלת אופן היישום).

רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים	רעילות לחי במים:
התכשיר רעיל לדבורים. כוורות של דבורי בומבוס יש לסגור לפני הריסוס ועד שלוש שעות לאחר גמר הריסוס. אין צורך להוציא את הכוורות מהשטח בזמן הריסוס. התכשיר רעיל לאויבים טבעיים.	רעילות לדבורים:
אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 12 שעות מריסוס. בבתי גידול ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי	כניסה מחדש לשטח המטופל:
מסוכן לבריאיות (III)	דרגת רעילות:

שילובים: בשילוב קורזיט עם תכשירים אחרים יש להכין תרחיף קורזיט תחילה. רק לאחר התרחיפות המלאה אפשר לערבב בו את התכשיר הנוסף. (גבוה מ-7 Hq) קורזיט רגיש לפירוק בתנאים בסיסיים ולכן אין לשלבו עם קוטלי פטריות בסיסיים כגון מרק קליפורני.

הוראות שימוש:

אופן היישום: קורזיט ניתן לריסוס בשטח הגלוי וכן בגידולים חסויים

טיפול אחרון לפני אסיף / קטיף (ימים)	חובה לשלב קורזיט במכל המרסס עם אחד מקוטלי הפטריות הבאים (המינון ג' או סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"ד/ג")**	המינון (ג'/'ד')*	המחלה	הגידול
3	מנצידן א"ר (250), מנצידן ג"ר (250), מנקו-די ג"ר (250)	50-20	80-60 בשילוב עם קוטל פטריות נוסף, ראה טעיף שילובים	כימשון	תפוח אדמה
12	דאקוניל א"ר (200), בראבו ת"ר (270)				
28	סכור ג"ר (150)				
7	רידומיל גולד MZ ג"ר (300)				
12	פוליו גולד ת"ר (250)				
14	קליפמן ג"ר (150)	100-20		עגבנייה	
5	מנצידן א"ר (250), מנצידן ג"ר (250)				
3	קליפמן ג"ר (150)				
5	רידומיל גולד MZ ג"ר (300)				
למאכל: 5 לתעשייה: 14	פוליו גולד ת"ר (250)				

* מרססים במינון הנמוך בטיפול מניעה או ברמת נגיעות נמוכה.

** יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות. נפח תרסיס גבוה מיועד לשטחים מפותחים בהדליה.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 05/ה"צ/1829. מס' או"ם: 3077.