



קורזיט 60 גר

Curzate® 60 WG

کورزیت

קוטל פטריות

קטל פטריות

27

קבוצה

גורמים רחפים WG

קוטל מחוללי מחלות בצמחים, סיסטמי, להדברת כימיון בתפוח אדמה ובעגבנייה, המיועד לריסוס אך ורק בתערובות עם קוטלי מחוללי מחלות בצמחים אחרים המורשים לכך

מכיל: Cymoxanil 60%

מס' סדרת ייצור ותאריך ייצור (Batch No. / Dates):

50 x 20 mm MINIMUM
SANS TEXTE
DANS CETTE ZONE
(CET ENCADRE EST À SUPPRIMER AVANT IMPRESSION)

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 1829/צ/05

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

משוק ע"י: גדות אגרו **GADOT Agro**

משרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001 | www.gadotagro.co.il

מיוצר ע"י: קורטבה, צרפת
TM & Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

פסקת אחריות: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנגזרת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לציפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

02-02-66 K-00000/0000 - COUNTRY

תכולה: 1 ק"ג

אופן היישום: קורזיט ניתן לריסוס בשטח הגלוי וכן בגידולים חסויים.

הגידול	המחלה	מינון קורזיט* (ג'/'ד')	נפח התרסיס** (ל'/'ד')	חובה לשלב קורזיט במכל המרסס עם אחד מקוטלי הפטריות הבאים (המינון - גרם או סמ"ק/ד')	טיפול אחרון / לפני אסוף (קטיף ימים)
תפוח אדמה	כימיון	80-60 בשילוב עם קוטל פטריות נוסף - ראה סעיף שילובים	50-20	מנצידין א"ר (250) מנצידין ג"ר (250) מנקו-די ג"ר (250)	3
				דאקוניל א"ר (200) בראבו ת"ר (270)	12
				סכור ג"ר (150)	28
				רדומיל גולד MZ ג"ר (300)	7
				פוליו גולד ת"ר (250)	12
עגבנייה	כימיון	80-60 בשילוב עם קוטל פטריות נוסף - ראה סעיף שילובים	100-20	קליפמן ג"ר (150)	14
				מנצידין א"ר (250) מנצידין ג"ר (250)	5
				קליפמן ג"ר (150)	3
				רדומיל גולד MZ ג"ר (300)	5
למאכל: 5 לתעשייה: 14				פוליו גולד ת"ר (250)	

* מרססים במינון הנמוך בטיפול מניעה או ברמת גיעות נמוכה.
** יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות. נפח תרסיס גבוה מיועד לשטחים מפותחים בהדליה.

מירווח בין ריסוסים: 5-10 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות, לתנאים המטאורולוגיים ולתכשיר המשתלב. גשם שיירד שעתים ומעלה לאחר ריסוס קורזיט לא יפגע בפעילות התכשיר. יש לשלב במעקבות הטיפול גם תכשירים חלופיים בעלי מנגנון פעולה שונה כדי למנוע התפתחות עמידות. אין לרסס קורזיט יותר מ-7 פעמים בעונה.

שילובים: בשילוב קורזיט עם תכשירים אחרים יש להכין תרחיף קורזיט תחילה. רק לאחר התרחפות המלאה אפשר לערבב בו את התכשיר הנוסף.

קורזיט רגיש לפירוק בתנאים בסיסיים (pH גבוה מ-7) ולכן אין לשלבו עם קוטלי פטריות בסיסיים כגון מרק קליפורני.



בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות המאפשרות ע"י המשך הליגת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: מיד בגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

כניסה מחדש לחלקה המטופלת: אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 12 שעות מריסוס. בבתי גידול ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או עם מספוא. יש להגן על התכשיר מלחות וממים.

טיפול בתכשיר שנשפך: אסוף תכשיר שנשפך (רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי) לכלי סגור לתכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: השלך את שקית התכשיר שהתרוקנה לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של שאיפה, יש להעביר את האדם הנפגע לאזור מאוורר. במקרה של חשיפה משמעותית יש להיוועץ ברופא. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך 15 דקות גם מתחת לעפעפיים. פנה לרופא. במקרה של בליעה, פנה לרופא. אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה שטוף את פיו במים. במקרה של מגע בעור, יש להסיר מיד בגדים מלוכלכים ולרוחץ את איברי הגוף שהדהמו במים ובסבון. פנה לרופא אם התפתח גירוי או אלרגיה.

מידע לרופא: במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.