

BAYER

Ronstar®
רונסטאר

תכולה: 5 ליטרים

קבוצה 14 קוטל עשבים

קוטל עשבים חד שנתיים וחבלבל בירקות, בפרחים, בעצי פרי ובעצי נוי
מכיל: 250 ג' / 7" Oxadiazon

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | מס' או"ם: 1993
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 83/ה"צ/389

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיצר ע": Bayer AG, גרמניה או טורקיה
משוק ע": גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555 קדרון 7079500
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

520061450050000 | 08/2022, תווית, עידון

IL05974495L

Bayer



Ronstar / ISRAEL

5-L- Booklet Outer page (Front Page) (150x145mm)

Bayer CropScience
Cyprus OfficeDate : 27.08.2022
Dimensions: 150x145 mm

Created by : A. Mahmoud

Code Files for Server : 05974495L


File reference : IL.05974495L(150x145mm)

Loaded by: A. Mahmoud

Finish - File

Illustrator CC

CMYK



<p>Bayer CropScience Cyprus Office</p>	<p>Created by : A. Mahmoud Code Files for Server : 05974495L File reference : IL.05974495L(150x145mm) Loaded by: A. Mahmoud</p>
<p>Date : 27.08.2022 Dimensions: 150x145 mm</p>	
<p>Finish - File Illustrator CC CMYK</p>	



רונסטאר רונסטאר® Ronstar

כללי:

רונסטאר הינו קוטל עשבים שאריתי המיועד למניעת הצצה של מיגוון עשבים חד-שנתיים ולקטילה של מיני עשבים רגישים בירקות, בפרחים, בעצי פרי ובעצי נוי, כמפורט בהוראות השימוש. הודות למסיסותו הנמוכה במים מתרכז התכשיר בשכבת הקרקע העליונה (5 ס"מ). נבטים העוברים דרך השכבה המטופלת נקטלים. התכשיר נקלט בצמח דרך הנצרון, קליטתו ע"י מערכת השורשים הינה מעטה ביותר וזניחה.

מניעת הצצה:

רונסטאר מונע הצתם של מיגוון עשבים חד-שנתיים (רחבי עלים ודגניים), לאחר הפעלתו ע"י גשם או ע"י המטרה.

מיני עשבים מהמשפחות הבוטניות: סוככיים, מורכבים וקטניות גדולות זרע מגלים רגישות בינונית ולא ניתן למונע את הצתם במינונים הנמוכים מ-500 סמ"ק לדונם.

קטילת עשבים קיימים:

נבטי ירבוז, חלמית, רגלה ועשן נפגעים במיוחד ע"י **רונסטאר**. לשיפור הקטילה של מינים אלה לאחר שלב נבט וכן להדברת נבטי מינים אחרים - ניתן לשלב **רונסטאר** עם דו קטלון או עם בסטה.

צמחי חלמית ומעוג רגישים לרונסטאר גם בשלבים מפותחים ואין צורך לשלב קוטל עשבים נוסף להדברתם. יתרה מזאת, להדברת מינים אלה מספיק מינון של 50-100 סמ"ק לדונם, אך בתחום מינונים זה הפעילות השאריתית של **רונסטאר** קצרה. חבלבל נצרב קשות ע"י **רונסטאר** והתפתחותו מתעכבת. יש לטפל בחבלבל בהגיעו לאורך 10-15 ס"מ ולתת טיפול חוזר עם התחדשותו.

אזהרות: עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. גורם לגירוי בעור. גורם לגירוי חמור בעיניים. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת. חשיפה חוזרת לתכשיר עלולה לגרום נזק, נוזל ואדים דליקים. הרחק ממקורות חום ואש.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה - לבש סרבול עם שרולים ומכנסיים ארוכים ומעליו חליפת מגן עמידה לכימיקלים, מגפי גומי, כפפות ניטריל (תקן EN-374/3), משקפי מגן (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים (תקן EN-140)



<p>Bayer CropScience Cyprus Office</p>	<p>Created by : A. Mahmoud</p> <p>Code Files for Server : 05974495L</p> <p>File reference : IL.05974495L(145x130mm)</p> <p>Loaded by: A. Mahmoud</p>
<p>Date : 27.08.2022 Dimensions: 145x130 mm</p>	
<p>Finish - File Illustrator CC CMYK</p>	



עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3 מנע מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס בעור ובעיניים, אין לשאוף את אדי התכשיר או את של התרסיס. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.

סכנות לסיבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: רונסטאר אינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש כלליות:

מועד הריסוס: רסס את התכשיר בטרם הציצו עשבי הבר ולא יאוחר משלב נבטים צעירים. אם קיימת עשבייה מבוססת בשטח, ניתן לשלב **רונסטאר** עם דו קטלון או עם בסטה בטיפול הקודם לשתילה, או קדם הצצת הגידול התרבותי, כמפורט בטבלה.

הכנת החלקה לקראת שתילת ירקות או פרחים: השטח המיועד לריסוס יהא ישר, מוחלק ומהודק במעגלה, ללא שיירי חומר צמחי. חשוב לפורר את הרגבים ולהקפיד על אחידות מצע השתילה. בקרקע קלה חשוב להדק את הקרקע כדי למנוע שקיעה של האדמה ו/או של השתילים לעומק ופגיעה בברירות השכבתית. אין לרסס **רונסטאר** בקרקע חולית מחשש לפגיעה בברירות השכבתית ולנדידת התכשיר אל בית השורשים. יישום **רונסטאר** על גבי קרקע לחה תשפר פעולתו במניעת הצצה.

עיבוד לאחר הריסוס: עיבוד השטח המרוסס או הזזת השכבה המטופלת על-ידי טיפולים אגרונטכניים פוגמים ביעילות הטיפול ומקצרים את משך פעולתו.

הכנת התרסיס: את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו במים ותוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים.

נפח התרסיס: נפח התרסיס לא יהא פחות מ-20 ליטר לדונם. בריסוס לקטילת עשבייה קיימת יהיה נפח התרסיס כנדרש לכיסוי נוף העשבים.

אופן השתילה: בשתילה ידנית יש להשתמש בדקר מתאים ולהקפיד על עומק שתילה, באופן שכיסוי הקרקע והידוקה יהיה על צוואר השורש המשועם ולא על הגבעול הירוק. בשתילה עמוקה ולא מבוקרת רונסטאר עלול להיקלט בריקמת הגבעול הירוק של השתיל הצעיר ולגרום לנזק. בשתילה ממוכנת נדרשת הקפדה יתרה הן בבחירת החלקה, הן בהכנת המצע והן בשמירה על עומק ודיוק השתילה.



<p>Bayer CropScience Cyprus Office</p>	<p>Created by : A. Mahmoud</p> <p>Code Files for Server : 05974495L</p> <p>File reference : IL.05974495L(145x130mm)</p> <p>Loaded by: A. Mahmoud</p>
<p>Date : 27.08.2022 Dimensions: 145x130 mm</p>	
<p>Finish - File Illustrator CC CMYK</p>	



אופן היישום:

הוראות מיוחדות	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול
	500	לפני השתילה	פרחים: גיבסנית, עדעד, אסתר, טגטס, חרצית, דליה, ציפורני-חתול, מנתור
	600-500	משבוע לאחר השתילה ובמשך כל עונת הגידול	ציפורן
1. הקפד לרסס נמוך ככל האפשר והשקה מיד לאחר הריסוס. 2. אין לרסס על עיניים תפוחות ועל לבלוב צעיר.	600-500	מיד לאחר שתילת הייחורים ובמשך עונת הגידול בריסוס מכוון בלבד.	משתלות ורד
1. אין להגביה את פומיות הריסוס מעבר ל-30 ס"מ מעל פני הקרקע. רצוי להשתמש בפומיות מניפה רחבות זזית (טי-ג'ט-110°). 2. הימנע מריסוס ע"ג עלים ופריצות והמטר מיד לאחר הריסוס.	600-500	במשך עונת הגידול - בריסוס מכוון בלבד. אין לרסס בחממות סגורות בעונת הקטיף (אוקטובר-מאי)	ורד לקטיף
אין לרסס במשתלות ברוט.	600-500	לאחר הזריעה ולפני הצצה	סיפן לפריחה

**Bayer CropScience
Cyprus Office**

Date : 27.08.2022
Dimensions: 145x130 mm

Created by : A. Mahmoud

Code Files for Server : 05974495L

File reference : IL.05974495L(145x130mm)

Loaded by: A. Mahmoud



הוראות מיוחדות	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול
<p>1. המינון ייקבע בהתאם למשך הפעולה הרצוי (3-7 חודשים). 2. אין לרסס על עיניים תפוחות ועל לבלוב צעיר. 3. בשנה האחרונה במשתלה מרססים במינון שאינו עולה על 500 סמ"ק/ד'.</p>	1000-500	ע"ג ייחורים ושיתלים בתרדמה בלבד	עצי פרי: משתלות נשירים
אם מטפלים בפס, יש לחשב את המינון לפי מימדי השטח המטופל.	600	מיד לאחר הנטיעה ובמשך כל הגידול - בריסוס מכון מתחת לנוף	עצי פרי (כל המינים)
המינון ייקבע בהתאם למשך הפעולה הרצוי (3-7 חודשים). עם התחדשות הצצת העשבים ניתן לבצע ריסוס נוסף.	1000-500	מיד לאחר הנטיעה ובמשך כל הגידול - בריסוס מכון מתחת לנוף	בונה
<p>1. אם מטפלים בפס, יש לחשב את המינון לפי מימדי השטח המטופל. 2. הימנע מריסוס התכשיר על עלוות העצים.</p>	600	מיד לאחר הנטיעה ובמשך כל הגידול - בריסוס מכון מתחת לנוף	הדרים



Bayer CropScience Cyprus Office	Created by : A. Mahmoud
Date : 27.08.2022 Dimensions: 145x130 mm	Code Files for Server : 05974495L
	File reference : IL.05974495L(145x130mm)
	Loaded by: A. Mahmoud
Finish - File	Illustrator CC CMYK



הוראות מיוחדות	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול
טיפול ראשון בהגיע הבצל לגיל 2 עלים, כאשר אורך העלה האמיתי השני 5 ס"מ לפחות. הטיפול המשלים - בהגיע הצמחים לגיל 4 עלים.	+ 100 200	לאחר הצצת הבצל 1. בשלב 2 עלים 2. בשלב 4 עלים	בצל זרוע: (כל הזנים)
על חלקה נקיה מעשבים מפעילים את התכשיר מיד לאחר הריסוס. בריסוס על נבטי עשבים דוחים את מתן ההמטרה לכ-48 שעות. אין לשלב רונסטאר עם קוטלי עשבים אחרים.	250	לאחר הצצה בשלב 3-4 עלים	אורי, בשור
	350	בשלב של 3 עלים	גרנו, מצרי, ריברסיד
	350	לאחר השתילה: לאחר שהשתילים נקלטו היטב	בצל שתול
	350	החל משבוע לאחר ההצצה	בצלצולים
1. לפני הריסוס הקפד על הכנת מצע שתילה אחיד ונקי מעשבים. 2. לאחר הריסוס ולפני השתילה יש להשקות לפחות בשיעור של 20 מ"ק/ד'. 3. רצוי לשתול בדקר ולהימנע ככל האפשר מהזזת הקרקע המטופלת.	500	לאחר הזריעה ובמשך כל עונת הגידול	שום
	350	קדם שתילה לפני ההמטרה הקודמת לשתילה	ירקות בשטח הפתוח בלבד: כרוביים, פלפל, עגבניה, חציל, כרפס



Bayer CropScience Cyprus Office	Created by : A. Mahmoud
Date : 27.08.2022 Dimensions: 145x130 mm	Code Files for Server : 05974495L File reference : IL.05974495L(145x130mm) Loaded by: A. Mahmoud
Finish - File	Illustrator CC CMYK



הוראות מיוחדות	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול
<p>1. השקיה מיד לאחר הריסוס. 2. על כרפס מטופל ברונסטאר כנ"ל אין לרסס בקוטל עשבים נוסף, אלא כעבור מספר ימים.</p>	350	מיד לאחר השתילה ולפני מתן המטרת הקליטה.	כרפס
<p>1. מרססים על חלקה נקייה מעשבים ומוכנה לשתילה. 2. יש להפעיל את התכשיר בהמטרה בכמות של 20 מ"ק/ד' לפחות. 3. משתמשים במינון הנמוך בקרקעות הקלות ובמינון הגבוה בקרקעות הבינוניות והכבדות.</p>	400-300	כשבוע לפני השתילה	בטטה
אין לטפל בירקות הנשתלים תחת מעטה פלסטי.			
<p>1. מרססים על חלקה נקייה מעשבים ומשקים בשיעור של 20 מ"ק/ד' לפחות. 2. בעת השתילה הימנע ככל האפשר מהזזת הקרקע המטופלת. 3. אין לחפות את הערוגות אלא כעבור חודש ימים לפחות ממועד היישום.</p>	400	קדם שתילה	תות-שדה



<p>Bayer CropScience Cyprus Office</p>	<p>Created by : A. Mahmoud</p> <p>Code Files for Server : 05974495L</p> <p>File reference : IL.05974495L(145x130mm)</p> <p>Loaded by: A. Mahmoud</p>
<p>Date : 27.08.2022 Dimensions: 145x130 mm</p>	
<p>Finish - File Illustrator CC CMYK</p>	



הוראות מיוחדות	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול
1. בריסוס. 2. באמצעות משפך גינה: מכנים תמיסת רונסטאר המורכבת מ-6 סמ"ק רונסטאר לכל 10 ליטר מים ומזלפים בעזרת משפך גינה 1 ליטר תמיסה ל-1 מ"ר קרקע.	600	לאחר ההשתרשות - בטיפול מתחת לנוף	עצי נוי שיחי-נוי מעוצים

שילובים: במטעים של עצי פרי ובעצי נוי ניתן לשלב **רונסטאר** עם בסטה בטיפול מכוון מתחת לנוף, מכוון מתחת לנוף, אך בשום אופן לא כאשר יש חשש להגעת רחף התרסיס לעלוה או לחלקים הירוקים של הגידול המטופל. בהדרים ניתן לשלב עם בסטה או עם אורגן בטיפול מכוון מתחת לנוף.

הפעלת התכשיר: לאחר היישום הפעל את התכשיר ע"י המטרה (15-40 מ"ק/ד'). בעת ההמטרה יש להימנע מהתזת גרגרי חול על עלוות השתילים. הקפד על כך בעיקר באדמות קלות. השתמש בממטרים עם חריר קטן עד בינוני והבטח ספיקה מתאימה. כשהריסוס מבוצע על קרקע יבשה, ניתן לדחות את ההפעלה עד ל-7 ימים לאחר הריסוס, אך הצצת העשבים תימנע רק לאחר הפעלת התכשיר בגשם או בהמטרה. כשהריסוס מבוצע על עשבייה קיימת, עם או בלי קוטלי עשבים קיימים, יש לדחות את ההמטרה עד חלוף 48 שעות מהריסוס. בריסוס על קרקע לחה יש להפעיל את התכשיר ביום הריסוס מחשש לפחיתה ביעילותו. הפעלת התכשיר בטפטוף אינה אחידה ולכן אינה יעילה. יתרה מזאת, טפטוף לא מבוקר עלול לדחוק את התכשיר לעומק בית השורשים, לפגום בבירנות השכבתית ולגרם נזק לשתילים הצעירים.

Bayer CropScience Cyprus Office	Created by : A. Mahmoud
Date : 27.08.2022 Dimensions: 145x130 mm	Code Files for Server : 05974495L File reference : IL.05974495L(145x130mm) Loaded by: A. Mahmoud
Finish - File	Illustrator CC CMYK



בגמר השימוש

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשארייות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט (רצוי בתכשיר אולקליר אקסטרה). את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שארייות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בתום הריסוס התרחץ והחלף בגדיך. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.

מועד כניסה מחדש: הכניסה לחלקה המטופלת מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.

אחסון: אחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ושל אנשים לא מוסמכים. אין לאחסן את התכשיר ליד זרעים או ליד דשנים. יש לשמור באריזה מקורית וסגורה, במקום מוצל וקריר.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בנוסרת או בחול כדי לספוג. לאחר מכן יש לאסוף לכלי סגור. תכשיר שנשפך, שפך תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את המכל היטב, לפחות 3 פעמים, או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מכל המרסס, נקב ומערך את המכל השטוף והשלך אותו למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: • במקרה של שאיפת אדי התכשיר, פנה את הנפגע לאזור מאוורר היטב. במקרה של הרגשה לא טובה - פנה לרופא • במקרה של מגע בעור, הסר מיד בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר אם הופיע גירוי פנה לרופא • במקרה של מגע בעיניים, שטוף את העיניים במים נקיים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות. הסר עדשות מגע אם ישנן. פנה לרופא אם התפתח גירוי • במקרה של בליעה, שטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לרופא. במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

פיסקת אחריות: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.



<p>Bayer CropScience Cyprus Office</p>	<p>Created by : A. Mahmoud</p> <p>Code Files for Server : 05974495L</p> <p>File reference : IL.05974495L(145x130mm)</p> <p>Loaded by: A. Mahmoud</p>
<p>Date : 27.08.2022 Dimensions: 145x130 mm</p>	
<p>Finish - File Illustrator CC CMYK</p>	



BAYER

Ronstar®
רונסטאר

תכולה: 5 ליטרים

קבוצה 14 קוטל עשבים

קוטל עשבים חד שנתיים וחבלבל בירקות, פרחים, בעצי פרי ובעצי נוי
מכיל: 250 ג' / 7" Oxadiazon
דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | מס' או"ם: 1993
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 389/ה"צ/83
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיצר ע"י: Bayer AG, גרמניה או טורקיה
משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ
GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קרוין 7079500
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

עודכן תווית: 08/2022 | 52006145050000

Bayer



Ronstar / ISRAEL
5-L- Booklet Outer page (Front Page) (150x145mm)

<p>Bayer CropScience Cyprus Office</p>	<p>Created by : A. Mahmoud</p> <p>Code Files for Server : 05974495L</p> <p>File reference : IL.05974495L(150x145mm)</p> <p>Loaded by: A. Mahmoud</p>
<p>Date : 27.08.2022 Dimensions: 150x145 mm</p>	
<p>Finish - File Illustrator CC CMYK</p>	