



# תמנון / تامنون / Tamnun

תרכיז נוזלי, מכיל: 722 גרם בליטר Propamocarb HCl



## קוטל מחוללי מחלות בירקות ובפרחים

תכשיר סיסטמי המדביר גורמי מחלה מקבוצת הפיקומיצטים (פיטופתורה, ברמיה, פסאודופרונוספורה, פרונוספורה, פיתיום).



רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה מימית. מנע הגעת החומר או תשטיפיו לבריכות דגים, לדרכי ניקוז או למקורות מים
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	24 שעות לאחר היישום. לאחר התייבשות מלאה של התרסיס
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

### הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/דונם)	יישום אחרון לפני אסיף/ קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימשון הסולניים	250	14
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	300 בנפח תרסיס עד 100 ל"ד'	3
		0.25%	
חסה	כשותית החסה	250	14
כרוב (במשלה)	כשותית המצליבים	0.15%	-

### טיפול הגמעה למניעת מקמקת (פיתיום):

הגידול	המחלה	המינון	אופן הטיפול	הערות
מלפפון	מקמקת (פיתיום)	200 סמ"ק של תמיסה בריכוז של 0.15% (1.5 סמ"ק לכל ליטר מים)	הגמעה בקיני הזריעה או מסביב לצמח להרוויה בעומק השורשים	יש לחזור על הטיפול כעבור 2-4 שבועות במידת הצורך
תות שדה	מקמקת (פיתיום)	200 סמ"ק של תמיסה בריכוז של 0.15% לכל קו זריעה או שתיל	השורשים בעומק	2-3 טיפולים במרווחים של 7 ימים
פלרגוניום, חלבלוב, פפרומיה, בשמת, ביגוניה, פטוניה	מקמקת (פיתיום)	0.3%-0.15% 30-15 סמ"ק למ"ר	הגמעה להרוויה הקרקע בעומק השורשים	

רשיון השירותים להגנת הצמח ולביקורת מס': 7007 /ה"צ/ 4036. מס' או"ם: לא מסווג.