

נוקס נוקס Nox

גרגירים רחיים WG
קוטל חרקים

מכיל: Fenoxycarb 25%



קבוצה 7B קוטל חרקים

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | מס' או"ס: לא נקבע | רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 20/ה"צ/5360

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للإستخدام الزراعي فقط

מס' סדרת ייצור:

משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

מיוצר ע"י: Huzhou Rongsheng Agrochemical Co., Ltd, סין

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500

טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001, www.gadotagro.com

עידכון תווית: 02/2024 | 514061960010001



תכולה: 1 ק"ג

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.

כניסה מחדש לחלקה המטופלת: אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה לפני התיישבות טיפות התרסיס על הגידול.

אחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממרכזי מזון וממספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. **תכשיר שהתפזר:** תכשיר שהתפזר, יש לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה, תכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחיובי פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מכל המרסס ולהשליך את האריזה לפח האשפה.

עזרה ראשונה: • במקרה של חשד להרעלה, פנה את הנפגע לאזור מאוורר היטב. קרא מיד לרופא והראה לו את תווית האריזה של התכשיר. • במקרה של מגע בעור, הסר בגדים מזהמים וישטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר. פנה לרופא אם התפתח גירוי • במקרה של מגע בעיניים, שטוף את העין במים נקיים במשך 15 דקות. פנה מיד לרופא • במקרה של בליעה, פנה מיד לרופא. אין לגרום להקאה. אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. פנה לרופא.

מידע לרופא: במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

סכנות לסביבה:

רעילות לחי במים: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או שרחף התרסיס לא יגיעו אל בריכות דגים, אגמים ונחלים.

רעילות לדבורים: התכשיר רעיל לרימות דבורים ולזחלי טוואי המשי. אין לרסס על צמחים בשלב הפריחה וזאת כדי למנוע זיהום של האבקה אשר עלול לגרום לתמותה חלקית של רימות הדבורים.

אין לרסס אם מהירות הרוח גבוהה מ-2 מ' לשנייה. אין לאפשר לבע"ח לרעות בחלקה שרוססה זה עתה. אין לאסוף יבול או מספוא משטח שרוסס לפני הזמן המצויין כמועד אחרון לריסוס לפני אסוף.

הכנת התרסיס: מלא את המרסס עד כדי מחציתו במים, הוסף את הכמות הדרושה של נוקס תוך כדי בחישה מתמדת והשלם את יתרת המים. כל זמן ההכנה והעבודה יש להקפיד על ערבול התרסיס. כמו כן יש להשתמש בתרסיס בסמוך להכנתו. אין להשאיר תרסיס מוכן ליום המחרת.

כללי: נוקס קוטל את החרקים הרגישים לו על ידי שיבוש תהליכי הגדילה, מניעת המעבר לדרגות התפתחות מתקדמות ופגיעה בפוריות הבוגרים והביצים. נוקס פועל במגע ובבליעה. לתכשיר יש כושר תנועה טרנסלמינרית בצמח (אך הוא אינו סיסטמי). נוקס אינו פוגע באקריות טורפות ובצרות טפיליות, ולכן הפרת המאזן הביולוגי מועטה יחסית.

אזהרות: מזיק בבליעה, גורם לגירוי בעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, כובע, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, משקפי מגן (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אבק התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

אופן היישום:

הגידול	המזיק	מועד הטיפול	המינון או הריכוז מנפח התרסיס	נפח התרסיס (ל'ד')	טיפול אחרון לפני האסוף/הקטיף (ימים)
גזר	פסילת הגזר	עם הופעת ביצים על הצמחים	100 ג'ד'	20-50	14
רימון	כנימת עש הרימון	יש להתחיל בריסוסים עם תחילת הפעילות של בוגרי כנימת עש הרימון	0.1%	150-200	14

אין ליישם נוקס יותר מפעמיים בעונה. המירווח בין הריסוסים: בגזר - 14 יום, ברימון - 19 יום.

עמידות: כדי למנוע התפתחות ו/או התבססות של עמידות לתכשיר יש לשלב במעקבות הטיפול גם תכשירים חלופיים בעלי מנגנון פעולה שונה וכן אמצעים נוספים, כגון: חרקים טורפים ופורומנים המבלבלים והמשבשים את הפעילות המינית של החרקים. **אין לרסס נוקס יותר מפעמיים בעונה.**

שילובים: אין לשלב נוקס בתכשירים נוספים.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך