



אוסטין / אוסטין / Austin

תרכיז רחף, מכיל: 150 ג'ל/ל Difenconazole + 200 ג'ל/ל Azoxystrobin



להדברת מחוללי מחלות בגידולי שדה, בירקות, בעצי פרי ובגפן

אוסטין הינו קוטל פטריות רחב טווח המכיל שני מרכיבים פעילים, המשלימים זה את פעולתו של זה. שני המרכיבים שייכים לקבוצות כימיות שונות ומייצגים מנגנון פעולה שונה. Difenconazole השייך לקבוצת הטרואזולים ו-Azoxystrobin מקבוצת הסטרובילורונים. השילוב של שני חומרים פעילים, משפר את היעילות ומפחית את הסיכון לפיתוח עמידות.

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
רעילות לדבורים:	אוסטין אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לחלקה המרוססת ללא הגנה מתאימה, במהלך 12 שעות לאחר הריסוס
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (III)

שילובים: אין לשלב אוסטין בתכשירים נוספים.

הוראות שימוש:

יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשוניים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים. אין ליישם על צמחים המצויים בעקה. מנע רחף לגידולי תרבות שכנים. בתפוח אדמה, בצל, בשום, בחמצה, בגפן, במשמש, באפרסק, בשקד - אין ליישם אוסטין יותר משני יישומים לכל עונת גידול. במקרה, ששני היישומים בתכשיר, הינם עוקבים, המירווח בין שני היישומים יהיה 14 יום. במקרה, שהיישום העוקב מתבצע בתכשיר שונה, אין ליישמו במירווח גדול מ-14 ימים, לאחר יישום אוסטין.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון או הריכוז	נפח התרסיס (ל'ד')*	טיפול אחרון לפני קטיף / בציר (מים)
תפוח אדמה	חלפת	50 סמ"ק/ד'	40-20	14
בצל	כימסון השקעים (סטמפיליום), כשותית הבצל		40-20	21
שום	כימסון השקעים (סטמפיליום), חילדון השום		30-20	21
חמצה	שידפון (אסקוכיטת החמצה)	30-15		81
אפרסק, משמש	חילדון הגלעיניים	0.05%	להרטבה מלאה	14
				שקד
תפוח מהזן פינק ליידי	רקבון הקליפה (אלטרנריה אלטרנטה)			14
אפרסמון	כתמי עלים			30
גפן	קמחון הגפן			60

* בהתאם לגודל הנוף לכיסוי מלא של העלווה והפירות.

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 2022/ה'צ/4468. מספר או"ם: 3082.

